

福岡大学西新病院院内フォーミュラリー（推奨薬リスト）一覧

薬効群	第一選択薬	第二選択薬	備考
PPI	後 ランソプラゾールOD錠15mg(16.4円/錠) 後 ラベプラゾールNa塩錠10mg(34.4円/錠)	先 タケキャブ錠20mg(157.9円/錠) 先 ネキシウムカプセル20mg(100円/錠)	<ul style="list-style-type: none"> ・簡易懸濁の場合はランソプラゾールを推奨 ・タケキャブはZollinger-Ellison症候群、吻合部潰瘍、非糜爛性胃食道逆流症の適応なし
抗アレルギー	後 フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg(13.6円/錠) 後 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg(10.5円/錠)	先 デザレックス錠5mg(51.7円/錠)	<ul style="list-style-type: none"> ・フェキソフェナジンは眠気の副作用がほとんどなく、腎・肝障害にも使用しやすい ・デザレックスは眠気の副作用がほとんどなく、1日1回内服、食事の影響も受けない
抗インフルエンザ	後 オセルタミビルカプセル75mg(114.4円/Cap) 後 オセルタミビルDS3%(85円/g)	先 イナビル吸入懸濁用160mg(4241.5円/キット) 先 ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg(6331円/袋)	<ul style="list-style-type: none"> ・カプセルの内服が困難な場合はオセルタミビルDSを推奨 ・内服、吸入が困難な場合はラビアクタ推奨 ・オセルタミビル、ラビアクタは腎機能が低下している患者に減量が必要
経口麻薬	<p style="text-align: center;"><u>オキシコドン製剤</u></p> 定期:後 オキシコドン徐放カプセル5mg(94.5円/Cap) レスキュー:先 オキノーム散2.5mg(55.2円/包) <p style="text-align: center;"><u>モルヒネ製剤</u></p> 定期:先 MSコンチン錠10mg(245.6円/錠) レスキュー:先 オプソ内服液5mg2.5mL(114.5円/包)	<p style="text-align: center;"><u>フェンタニル製剤</u></p> 先 フェントステープ0.5mg(285.4円/枚) 先 フェントステープ1mg(528.9円/枚)	<ul style="list-style-type: none"> ・内服が難しい場合はフェントステープ推奨 ・オピオイド誘発性便秘症がある場合はスインプロロイク(1回1錠、1日1回)を追加
睡眠導入	先 ベルソムラ錠15mg(90.8円/錠) 先 デエビゴ錠5mg(87.9円/錠)	後 エズピクロン錠1mg(13.3円/錠) 先 ロゼレム錠8mg(85.9円/錠)	<ul style="list-style-type: none"> ・CYP3A阻害薬剤(ポリコナゾール、エリスロマイシン、イトラコナゾール、クラリスロマイシン等)との併用 →ベルソムラ:禁忌 →デエビゴ:併用注意(上記薬剤と併用する場合は2.5mg) ・ベルソムラ、デエビゴは入眠困難や中途覚醒など患者の症状に合わせて選択 ・ベンゾジアゼピン系睡眠薬は転倒、転落のリスクが高いため除外 ・エズピクロンは超短時間型
整腸	○ 抗菌薬なし → 後 ビオフェルミン錠(5.7円/錠) 先 ビオスリー配合OD錠(5.7円/錠) ○ 抗菌薬あり → 先 ミヤBM錠(5.7円/錠) 後 ビオフェルミン錠(5.7円/錠)	先 ミヤBM錠(5.7円/錠)	<ul style="list-style-type: none"> ・すべて簡易懸濁可能
緩下	後 酸化マグネシウム錠330mg、500mg(5.7円/錠)	先 アミティーザカプセル12μg(55.4円/Cap) 先 モビコール配合内用剤LD(75.3円/包) 先 リンゼス錠0.25mg(78.7円/錠)	<ul style="list-style-type: none"> ・酸化マグネシウムは腎障害時・高齢者・全身状態不良の場合は3ヶ月に一度、長期投与の場合にも定期的な血中Mg濃度測定 ・酸化マグネシウムは腎障害時は慎重投与 ・オピオイド誘発性便秘症がある場合はスインプロロイク(1回1錠、1日1回)を使用

鎮痛消炎 【外用】	後 ケトプロフェンテープ40mg(17.1円/枚) 後 ロキソプロフェンNaパップ100mg(17.1円/枚)	後 MS温シップ(17.2円/枚) 先 ジクトルテープ75mg(155.8円/枚)	<ul style="list-style-type: none"> ・ パップ剤 → 冷却効果あり、かぶれにくい、はがしやすい、背中・腰など広く動きの少ない部位に適する ・ テープ剤 → かぶれやすい、はがれにくい、肘・膝・関節などの動きの多い部位に適する ・ 温感が欲しいとき → MS温シップ ・ ジクトルテープ(ジクロフェナク)は癌性疼痛にも使用可能
--------------	--	--	---

※ 各薬剤の用法・用量は薬剤師にご相談ください

2022/8/1更新 薬剤部